

Fresubin 2 KCAL HP 500 ml 500 ml

Disponible en 2 volumes: **500, 1000 ml**



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 ml	500 ml
Énergie	kJ/kcal	838/200	4190/1000
Graisses	g	10	50
Saturées	g	3,1	15,5
TCM	g	2,6	13
Mono-insaturées	g	5,3	26,5
Polyinsaturées	g	1,6	8
Acide linoléique	g	1,08	5,4
acide α-linolénique	g	0,39	1,95
EPA	g	0,07	0,35
DHA	g	0,07	0,35
EPA + DHA	g	0,07	0,35
ω6/ω3		2,3:1	11,55
Glucides	g	18	90
Sucres	g	2,7	13,5
Lactose	g	≤ 0,50	≤ 2,5
Protéines	g	10	50
Sel	g	0,15	0,75
Eau	ml	69	345
Osmolarité	mOsmol/l	420	420
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	60	300
Potassium (K)	mg	170	850
Chloride (Cl)	mg	90	450
Calcium (Ca)	mg	205	1025
Magnésium (Mg)	mg	20	100
Phosphore (P)	mg	120	600
Fer (Fe)	mg	2,7	13,5
Zinc (Zn)	mg	2,4	12
Cuivre (Cu)	mg	0,27	1,35
Manganèse (Mn)	mg	0,53	2,65
Iode (I)	µg	26,7	133,5
Molybdène (Mo)	µg	20	100
Chrome (Cr)	µg	13	65
Fluor (F)	mg	0,27	1,35
Sélénium (Se)	µg	13	65
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	185	925
β-carotène	µg RE	45	225
Vitamine D	µg	2	10
Vitamine E	mg αTE	2,7	13,5
Vitamine K	µg	13	65
Thiamine	mg	0,27	1,35
Riboflavine	mg	0,35	1,75
Vitamine B6	mg	0,32	1,6
Vitamine B12	µg	0,53	2,65
Vitamine C	mg	13	65
Acide folique	µg	53,3	266,5
Biotine	µg	10	50
Niacine	mg/mg NE	3,2	16
Unités de niacine	mg NE	5,4	27
Acide pantothénique	mg	0,93	4,65
gN/NP kcal		1/100	5/500

Informations produit

Description

Alimentation complète par sonde, hypercalorique (2 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), avec huile de poisson, riche en acides gras monoinsaturés, avec TCM (26%) et sans fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition ayant des besoins protéiques et énergétiques accrus et/ou nécessitant une restriction hydrique. Sans gluten et cliniquement sans lactose.

Dosage

Les quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (2000 kcal) par jour.

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins énergétiques et protéiques accrus et/ou de restriction hydrique.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).

Informations d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l'enfant < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant

Ingrédients

Eau, sirop de glucose, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), caséinate de calcium (issu du **lait**), protéines de **lait**, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), maltodextrine, citrate de potassium, huile de **poisson**, émulsifiants (E 471, lécithines de **soja**), correcteur d'acidité (E 507), carbonate de potassium, chlorure de sodium, carbonate de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, sulfate de fer, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iode de potassium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Informations de commande Fresubin 2 KCAL HP 500 ml

Nombre de pièces par boîte	Code CNK (par pièce)
15 x 500 ml	2998-037
8 x 1000 ml	4609-525