

Fresubin DIBEN 1,5 KCAL HP 500 ml 500 ml

Disponible en 2 volumes: **500, 1000 ml**



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 ml	500 ml
Énergie	kJ/kcal	628/150	3140/750
Graisses	g	7	35
Saturées	g	1,82	9,1
TCM	g	1,2	6
Mono-insaturées	g	3,68	18,4
Polyinsaturées	g	1,50	7,5
Acide linoléique	g	0,99	4,95
acide α-linolénique	g	0,17	0,85
EPA	g	0,23	1,15
DHA	g	0,23	1,15
EPA + DHA	g	0,23	1,15
ω6/ω3		2,4:1	12,05
Glucides	g	13,1	65,5
Sucres	g	7,0	35
Lactose	g	≤ 0,5	≤ 2,5
Fibres	g	2,3	11,5
Protéines	g	7,5	37,5
Sel	g	0,14	0,7
Eau	ml	76	380
Osmolarité	mOsmol/l	440	440
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	55	275
Potassium (K)	mg	180	900
Chloride (Cl)	mg	85	425
Calcium (Ca)	mg	155	775
Magnésium (Mg)	mg	30	150
Phosphore (P)	mg	110	550
Fer (Fe)	mg	2	10
Zinc (Zn)	mg	1,8	9
Cuivre (Cu)	mg	0,2	1
Manganèse (Mn)	mg	0,4	2
Iode (I)	µg	20	100
Molybdène (Mo)	µg	15	75
Chrome (Cr)	µg	20	100
Fluor (F)	mg	0,2	1
Sélénium (Se)	µg	10	50
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	143	715
β-carotène	µg RE	33	165
Vitamine D	µg	2	10
Vitamine E	mg αTE	2,3	11,5
Vitamine K	µg	10	50
Thiamine	mg	0,2	1
Riboflavine	mg	0,26	1,3
Vitamine B6	mg	0,24	1,2
Vitamine B12	µg	0,4	2
Vitamine C	mg	12	60
Acide folique	µg	40	200
Biotine	µg	7,5	37,5
Niacine	mg/mg NE	2,4	12
Unités de niacine	mg NE	3,9	19,5
Acide pantothénique	mg	0,7	3,5
Choline	mg	55	275
gN/NP kcal		1/100	5/500

Informations produit

Description

Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,5 kcal/ml) et hyperprotéinée (20% AET), riche en acides gras mono-insaturés, avec huile de poisson, avec TCM (18%), avec un profil glucidique adapté pour contribuer au maintien d'une glycémie normale et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition en particulier en cas de troubles du métabolisme glucidique. Sans gluten et cliniquement sans lactose.

Dosage

Les quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1000 ml (1500 kcal) par jour

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de troubles du métabolisme glucidique, comme une perturbation de la tolérance au glucose, de l'hyperglycémie induite par le stress, du diabète mellitus.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).

Informations d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 3 ans et à utiliser avec précaution chez l'enfant < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant

Ingrédients

Eau, protéines de **lait**, huiles végétales (tournesol, colza, **soja**), isomaltulose®, amidon modifié de tapioca, maltodextrines, fructose, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), huile de **poisson**, inuline de chicorée, cellulose, citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de **soja**), phosphate de potassium, chlorure de sodium, chlorure de choline, citrate de sodium, stabilisants (E 460, E 466), oxyde de magnésium, vit. C, correcteur d'acidité (E 330), phosphate de fer, sulfate de zinc, niacine, chlorure de manganèse, acide pantothénique, vit. E, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, riboflavine, vit. B6, thiamine, vit. A, β-carotène, chlorure de chrome, acide folique, molybdate de sodium, sélénite de sodium, iodure de potassium, biotine, vit. K1, vit. D3, vit. B12.

Informations de commande Fresubin DIBEN 1,5 KCAL HP 500 ml

Nombre de pièces par boîte	Code CNK (par pièce)
15 x 500 ml	3238-888
8 x 1000 ml	3464-310