

Fresubin Hepa 500 ml

Disponible en 1 volumes: **500 ml**



Informations nutritionnelles

Contenu moyen		100 ml	500 ml
Énergie	kJ/kcal	546/130	2730/650
Graisses	g	4,7	23,5
Saturées	g	2	10
TCM	g	1,7	8,5
Mono-insaturées	g	1,4	7
Polyinsaturées	g	1,3	6,5
Acide linoléique	g	1,03	5,15
acide α-linolénique	g	0,26	1,3
ω6/ω3		4:1	205
Glucides	g	17,4	87
Sucres	g	0,7	3,5
Lactose	g	≤ 0,01	≤ 0,05
Fibres	g	1	5
Protéines	g	4	20
Sel	g	0,19	0,95
Eau	ml	78,5	392,5
Osmolarité	mOsmol/l	330	330
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	75	375
Potassium (K)	mg	120	600
Chlorure (Cl)	mg	71,5	357,5
Calcium (Ca)	mg	80	400
Magnésium (Mg)	mg	27	135
Phosphore (P)	mg	53	265
Fer (Fe)	mg	1,3	6,5
Zinc (Zn)	mg	1,2	6
Cuivre (Cu)	mg	0,13	0,65
Manganèse (Mn)	mg	0,27	1,35
Iode (I)	µg	13,3	66,5
Molybdène (Mo)	µg	10	50
Chrome (Cr)	µg	6,7	33,5
Fluor (F)	mg	0,13	0,65
Sélénium (Se)	µg	6,7	33,5
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	92	460
β-carotène	µg RE	22	110
Vitamine D	µg	1	5
Vitamine E	mg αTE	1,3	6,5
Vitamine K	µg	6,7	33,5
Thiamine	mg	0,13	0,65
Riboflavine	mg	0,17	0,85
Vitamine B6	mg	0,16	0,8
Vitamine B12	µg	0,27	1,35
Vitamine C	mg	6,7	33,5
Acide folique	µg	27	135
Biotine	µg	5	25
Niacine	mg/mg NE	1,6	8
Unités de niacine	mg NE	2,2	11
Acide pantothénique	mg	0,47	2,35
Choline	mg	28	140
gN/NP kcal		1/178	5/890

Informations produit

Description

Alimentation complète par sonde, hypercalorique (1,3 kcal/ml), riche en acides aminés branchés, avec TCM (37%) et avec fibres. Pour couvrir les besoins nutritionnels en cas de nutrition entérale par sonde des patients dénutris ou à risque de dénutrition en particulier les patients souffrant d'une insuffisance hépatique aiguë ou chronique. Sans gluten et cliniquement sans lactose.

Dosage

Les quantités doivent être déterminées par le prescripteur selon les besoins du patient. Dose recommandée pour une nutrition entérale complète : ≥ 1500 ml (1950 kcal) par jour.

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition en raison d'une maladie, en particulier en cas d'insuffisance hépatique aiguë ou chronique.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C).

Informations d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures. Ne pas utiliser si la poche est endommagée, gonflée ou si le contenu est coagulé. Ne pas mélanger de médicaments dans le produit.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas aux enfants < 1 ans et à utiliser avec précaution chez l'enfant < 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant

Ingrédients

Eau, maltodextrine, huiles végétales (huile de colza, huile de **soja**), triglycérides à chaîne moyenne, protéines de **soja** (avec lécithines de **soja**), fibres de **soja**, caséinate de sodium alimentaire (issue du **lait**), L-leucine, L-valine, hydrochlorure de L-arginine, citrate de potassium, L-isoleucine, phosphate de calcium, citrate de sodium, citrate de magnésium, chlorure de choline, vitamine C, correcteur d'acidité (E 330), oxyde de magnésium, carbonate de calcium, épaississant (E 407), sulfate de fer, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, riboflavine, fluorure de sodium, vitamine B6, sulfate de cuivre, thiamine, vitamine A, β-carotène, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Informations de commande Fresubin Hepa 500 ml

Nombre de pièces par boîte	Code CNK (par pièce)
15 x 500 ml	2489-177