



Informations nutritionnelles



Contenu moyen		100 ml	200 ml
Énergie	kJ/kcal	839/200	1678/400
Graisses	g	8,9	17,8
Saturées	g	2,7	5,4
Mono-insaturées	g	4,7	9,4
Polyinsaturées	g	1,5	3
EPA	g	0,04	0,08
DHA	g	0,02	0,04
Glucides	g	26,4	52,8
Sucres	g	8,2	16,4
Lactose	g	≤0,4	≤0,8
Isomaltulose	g	6,75	13,5
Fibres	g	1,2	2,4
Protéines	g	3	6
Sel	g	0,17	0,34
Eau	ml	71	142
Osmolarité	mOsmol/l	500	500
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	68	136
Potassium (K)	mg	100	200
Chloride (Cl)	mg	62	124
Calcium (Ca)	mg	84	168
Magnésium (Mg)	mg	20	40
Phosphore (P)	mg	55	110
Fer (Fe)	mg	2	4
Zinc (Zn)	mg	1,8	3,6
Cuivre (Cu)	mg	0,2	0,4
Manganèse (Mn)	mg	0,4	0,8
Iode (I)	µg	20	40
Molybdène (Mo)	µg	7	14
Chrome (Cr)	µg	3	6
Sélénium (Se)	µg	10	20
Vitamines et autres nutriments			
Vitamine A	µg RE	81	162
β-carotène	µg RE	33	66
Vitamine D	µg	1	2
Vitamine E	mg αTE	3	6
Vitamine K	µg	10,5	21
Thiamine	mg	0,26	0,52
Riboflavine	mg	0,3	0,6
Vitamine B6	mg	0,67	1,34
Vitamine B12	µg	0,6	1,2
Inositol	g	24	48
Vitamine C	mg	10	20
Acide folique	µg	100	200
Biotine	µg	12	24
Niacine	mg/mg NE	4	8
Acide pantothénique	mg	1,2	2,4
Choline	mg	55	110
Carnitine	mg	10	20
Taurine	mg	20	40

Informations produit

Description

Alimentation destinée à des fins médicales spéciales. Alimentation complète à boire et pour nutrition entérale, hyperénergétique (2 kcal/ml), avec fibres. Spécifiquement indiquée en cas d'insuffisance rénale et contenant de l'huile de poisson (EPA et DHA). Contient de l'amidon modifié et de l'isomaltulose, et est sans gluten et cliniquement sans lactose. Il s'agit d'une nutrition médicale pour les patients présentant (un risque de) dénutrition, en particulier en cas de maladie rénale chronique chez les patients dialysés. Renalive LP remplace le Fresubin Renal Drink.

Dosage

2-3 bouteilles/jour pour complémentation nutritionnelle orale partielle ou ≥ 5 bouteilles/jour pour nutrition complète. Les quantités doivent être déterminées et adaptées par le professionnel de santé selon les besoins du patient.

Indication

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénu- trition ou de risque de dénutrition, en particulier pour les patients avec une insuffisance rénale chronique ou aiguë.

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante (15-25 °C). Après ouverture, placer toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.

Informations d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Les produits ouverts peuvent être conservés jusqu'à 24 heures au réfrigérateur ou jusqu'à 6 heures à température ambiante. Se consomme de préférence frais.

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source d'alimentation. Ne convient pas à l'enfant de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. En cas d'alimentation par sonde, contrôler la vitesse d'administration et ne pas mélanger avec des médicaments.

Ingrédients

eau, maltodextrine, isomaltulose**, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), dextrine de tapioca, protéines de **lait**, triglycérides à chaîne moyenne, émulsifi ants (E 471, lécithines de **soja**), citrate de sodium, huile de **poisson**, arômes, bitartrate de choline, chlorure de potassium, citrate de potassium, vitamine C, oxyde de magnésium, inositol, taurine, correcteur d'acidité (E 524), L-carnitine, diphosphate ferrique, sulfate de zinc, niacine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vitamine E, vitamine B6, antioxydants (E 304, E 306), fl uorure de sodium, sulfate de cuivre, ribofl avine, thiamine, bêta-carotène, acide folique, vitamine A, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, chlorure de chrome, molybdate de sodium, vitamine K, vitamine B12, vitamine D. **L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.

Informations de commande Renalive LP

Produit	N° d'article	Code CNK
Renalive LP	8448601	5845-185