

Fresubin DIBEN 1,5 KCAL HP 500 ml

Beschikbaar in 2 volumes: **500, 1000 ml**



Voedingsinformatie

Gemiddelde inhoud		100 ml	500 ml
Energie	kJ/kcal	628/150	3140/750
Vetten	g	7	35
Verzadigde	g	1,82	9,1
MCT	g	1,2	6
Mono-onverzadigde	g	3,68	18,4
Poly-onverzadigde	g	1,50	7,5
Linolzuur	g	0,99	4,95
α-linoleenzuur	g	0,17	0,85
EPA	g	0,23	1,15
DHA	g	0,23	1,15
EPA + DHA	g	0,23	1,15
ω6/ω3		2,4:1	12,05
Koolhydraten	g	13,1	65,5
Suikers	g	7,0	35
Lactose	g	≤ 0,5	≤ 2,5
Vezels	g	2,3	11,5
Eiwitten	g	7,5	37,5
Zout	g	0,14	0,7
Water	ml	76	380
Osmolariteit	mOsmol/l	440	440
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	55	275
Kalium (K)	mg	180	900
Chloride (Cl)	mg	85	425
Calcium (Ca)	mg	155	775
Magnesium (Mg)	mg	30	150
Fosfor (P)	mg	110	550
Ijzer (Fe)	mg	2	10
Zink (Zn)	mg	1,8	9
Koper (Cu)	mg	0,2	1
Mangaan (Mn)	mg	0,4	2
Jodium (I)	µg	20	100
Molybdeen (Mo)	µg	15	75
Chroom (Cr)	µg	20	100
Fluor (F)	mg	0,2	1
Selenium (Se)	µg	10	50
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	µg RE	143	715
β-caroteen	µg RE	33	165
Vitamine D	µg	2	10
Vitamine E	mg αTE	2,3	11,5
Vitamine K	µg	10	50
Thiamine	mg	0,2	1
Riboflavine	mg	0,26	1,3
Vitamine B6	mg	0,24	1,2
Vitamine B12	µg	0,4	2
Vitamine C	mg	12	60
Foliumzuur	µg	40	200
Biotine	µg	7,5	37,5
Niacine	mg/mg NE	2,4	12
Niacine eenheden	mg NE	3,9	19,5
Pantotheenzuur	mg	0,7	3,5
Choline	mg	55	275
gN/NP kcal		1/100	5/500

Productinformatie

Omschrijving

Volledige, energie- (1,5 kcal/ml) en eiwitrijke (20 En%) sondevoeding, rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren, met visolie, met MCT (18%), met een aangepast koolhydratenprofiel voor een betere glycemische controle, met vezels. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding, in het bijzonder bij een verstoord glucosemetabolisme. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.

Dosering

Moet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1000 ml (1500 kcal) per dag.

Indicatie

Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij een verstoord glucosemetabolisme zoals bij verstoorde glucose tolerantie, stressgeïnduceerde hyperglycemie, diabetes mellitus.

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).

Gebruiksinfo

Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken. Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.

Extra gebruiksinfo

Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig te gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Ingrediënten

Water, melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloemolie, koolzaadolie, sojaolie), isomaltulose⁹, gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, fructose, middellange vetzuurketens (MCT), visolie, inuline (van cichorei), cellulose, kaliumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithinen), dikaliumwaterstoffsulfaat, natriumchloride, cholinechloride, natriumcitraat, stabilisatoren (E 460, E 466), magnesiumoxide, vit. C, zuurteregelaar (E 330), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, vit. E, kopersulfaat, natriumfluoride, riboflavine, vit. B6, thiamine, vit. A, β-caroteen, chroomchloride, foliumzuur, natriummolybdaat, natriumseleniet, kaliumjodide, biotine, vit. K1, vit. D3, vit. B12. ⁹Isomaltulose is een bron van glucose en fructose.

Bestelinformatie Fresubin DIBEN 1,5 KCAL HP

Aantal stuks per doos	CNK-code (per stuk)
15 x 500 ml	3238-888
8 x 1000 ml	3464-310

