

Fresubin Hepa 500 ml

Beschikbaar in 1 volumes: **500 ml**



Voedingsinformatie

Gemiddelde inhoud		100 ml	500 ml
Energie	kJ/kcal	546/130	2730/650
Vetten	g	4,7	23,5
Verzadigde	g	2	10
MCT	g	1,7	8,5
Mono-onverzadigde	g	1,4	7
Poly-onverzadigde	g	1,3	6,5
Linolzuur	g	1,03	5,15
α -linoleenzuur	g	0,26	1,3
$\omega 6/\omega 3$		4:1	205
Koolhydraten	g	17,4	87
Suikers	g	0,7	3,5
Lactose	g	$\leq 0,01$	$\leq 0,05$
Vezels	g	1	5
Eiwitten	g	4	20
Zout	g	0,19	0,95
Water	ml	78,5	392,5
Osmolariteit	mOsmol/l	330	330
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	75	375
Kalium (K)	mg	120	600
Chloride (Cl)	mg	71,5	357,5
Calcium (Ca)	mg	80	400
Magnesium (Mg)	mg	27	135
Fosfor (P)	mg	53	265
Ijzer (Fe)	mg	1,3	6,5
Zink (Zn)	mg	1,2	6
Koper (Cu)	mg	0,13	0,65
Mangaan (Mn)	mg	0,27	1,35
Jodium (I)	μ g	13,3	66,5
Molybdeen (Mo)	μ g	10	50
Chroom (Cr)	μ g	6,7	33,5
Fluor (F)	mg	0,13	0,65
Selenium (Se)	μ g	6,7	33,5
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	μ g RE	92	460
β -caroteen	μ g RE	22	110
Vitamine D	μ g	1	5
Vitamine E	mg α TE	1,3	6,5
Vitamine K	μ g	6,7	33,5
Thiamine	mg	0,13	0,65
Riboflavine	mg	0,17	0,85
Vitamine B6	mg	0,16	0,8
Vitamine B12	μ g	0,27	1,35
Vitamine C	mg	6,7	33,5
Foliumzuur	μ g	27	135
Biotine	μ g	5	25
Niacine	mg/mg NE	1,6	8
Niacine eenheden	mg NE	2,2	11
Pantotheenzuur	mg	0,47	2,35
Choline	mg	28	140
gN/NP kcal		1/178	5/890

Productinformatie

Omschrijving

Volledige, energierijke (1,3 kcal/ml) sondevoeding, met een verhoogd gehalte aan vertakte keten aminozuren, met MCT (37%) , met vezels. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met acute en chronische leverinsufficiëntie. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.

Dosering

Moet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1500 ml (1950 kcal) per dag.

Indicatie

Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding, in het bijzonder bij patiënten met acute en chronische leverinsufficiëntie

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).

Gebruiksinfo

Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken. Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.

Extra gebruiksinfo

Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 1 jaar en voorzichtig gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Ingrediënten

Water, maltodextrine, plantaardige oliën (raapzaadolie, **soja**olie), middellange vetzuurketens, **soja**-eiwit (met **soja**lecithines), **soja**vezel, eetbaar natriumcaseïnaat (uit **melk**), L-leucine, L-valine, L-arginine hydrochloride, kaliumcitraat, L-isoleucine, calciumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumcitraat, choline chloride, vitamine C, zuurteregelaar (E 330), magnesiumoxide, calciumcarbonaat, verdikkingsmiddel (E 407), ijzersulfaat, zinksulfaat, niacine, vitamine E, mangaanchloride, pantotheenzuur, riboflavine, natriumfluoride, vitamine B6, kopersulfaat, thiamine, vitamine A, beta-caroteen, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Bestelinformatie Fresubin Hepa 500 ml

Aantal stuks per doos	CNK-code (per stuk)
15 x 500 ml	2489-177

