

Fresubin DIBEN 1,5 KCAL HP 1000 ml

Beschikbaar in 2 volumes: **500, 1000 ml**



Voedingsinformatie

Gemiddelde inhoud		100 ml	1000 ml
Energie	kJ/kcal	628/150	6280/1500
Vetten	g	7	70
Verzadigde	g	1,82	18,2
MCT	g	1,2	12
Mono-onverzadigde	g	3,68	36,8
Poly-onverzadigde	g	1,50	15
Linolzuur	g	0,99	9,9
α-linoleenzuur	g	0,17	1,7
EPA	g	0,23	2,3
DHA	g	0,23	2,3
EPA + DHA	g	0,23	2,3
ω6/ω3		2,4:1	24,1
Koolhydraten	g	13,1	131
Suikers	g	7,0	70
Lactose	g	≤ 0,5	≤ 5
Vezels	g	2,3	23
Eiwitten	g	7,5	75
Zout	g	0,14	1,4
Water	ml	76	760
Osmolariteit	mOsmol/l	440	440
Mineralen en sporenelementen			
Natrium (Na)	mg	55	550
Kalium (K)	mg	180	1800
Chloride (Cl)	mg	85	850
Calcium (Ca)	mg	155	1550
Magnesium (Mg)	mg	30	300
Fosfor (P)	mg	110	1100
Ijzer (Fe)	mg	2	20
Zink (Zn)	mg	1,8	18
Koper (Cu)	mg	0,2	2
Mangaan (Mn)	mg	0,4	4
Jodium (I)	µg	20	200
Molybdeen (Mo)	µg	15	150
Chroom (Cr)	µg	20	200
Fluor (F)	mg	0,2	2
Selenium (Se)	µg	10	100
Vitamines en andere nutriënten			
Vitamine A	µg RE	143	1430
β-caroteen	µg RE	33	330
Vitamine D	µg	2	20
Vitamine E	mg αTE	2,3	23
Vitamine K	µg	10	100
Thiamine	mg	0,2	2
Riboflavine	mg	0,26	2,6
Vitamine B6	mg	0,24	2,4
Vitamine B12	µg	0,4	4
Vitamine C	mg	12	120
Foliumzuur	µg	40	400
Biotine	µg	7,5	75
Niacine	mg	2,4	24
Niacine eenheden	mg NE	3,9	39
Pantotheenzuur	mg	0,7	7
Choline	mg	55	550
gN/NP kcal		1/100	10/1000

Productinformatie

Omschrijving

Volledige, energie- (1,5 kcal/ml) en eiwitrijke (20 En%) sondevoeding, rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren, met visolie, met MCT (18%), met een aangepast koolhydratenprofiel voor een betere glycemische controle, met vezels. Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding, in het bijzonder bij een verstoord glucosemetabolisme. Glutenvrij en klinisch vrij van lactose.

Dosering

Moet bepaald worden door de voorschrijver volgens de behoeften van de patiënt. Aanbevolen dosis volledige voeding: ≥ 1000 ml (1500 kcal) per dag.

Indicatie

Voeding voor medisch gebruik bij patiënten met (risico op) ondervoeding, in het bijzonder bij een verstoord glucosemetabolisme zoals bij verstoorde glucose tolerantie, stressgeïnduceerde hyperglycemie, diabetes mellitus.

Bewaarcondities

Bewaar de gesloten verpakking op kamertemperatuur (15 - 25 °C).

Gebruiksinfo

Goed schudden voor gebruik. Na openen binnen 24 uur gebruiken. Niet gebruiken wanneer de zak is beschadigd, bol staat of wanneer de inhoud is gecoaguleerd. Niet mengen met geneesmiddelen.

Extra gebruiksinfo

Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen < 3 jaar en voorzichtig te gebruiken bij kinderen < 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.

Ingrediënten

Water, melkeiwit, isomaltulose, plantaardige oliën (hoogwaardige zonnebloemolie, raapzaadolie, sojaolie), tapioca dextrine, maltodextrine, fructose, middellange vetzuurketens, visolie, inuline, cellulose vezel, kaliumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithines), kaliumfosfaat, natriumchloride, choline chloride, natriumcitraat, stabilisatoren (E 460, E 466), vitamine C, magnesiumoxide, zuurteregelaar (E 330), ijzerdifosfaat, zinksulfaat, niacine, mangaanchloride, antioxidant (E 306), pantotheenzuur, vitamine E, kopersulfaat, natriumfluoride, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, β-caroteen, chroomchloride, foliumzuur, natriummolybdaat, natriumseleniet, kaliumjodide, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.

Bestelinformatie Fresubin DIBEN 1,5 KCAL HP

Aantal stuks per doos	CNK-code (per stuk)
15 x 500 ml	3238-888
8 x 1000 ml	3464-310

